

Generischer Name des Produkts Stoff, nachweisbare Injektionshilfe

Beschreibung Bei MONALISA High Elastic handelt es sich um ein steriles, ablasierbares Hyaluronidat, bestehend aus 90% Hyaluron und 10% Lidocain. MONALISA High Elastic wird in einer Glassflasche mit Luer-Lock-Anschluss geliefert. Die Sterilisation des Spritzenstifts erfolgte durch Anwendung von feurter Hitze und Druck. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die sterilen Einwegnadeln werden mit dem Spritzenstift geliefert. Auf der Produktverpackung sind Informationen über die Größe der Nadel aufgedruckt.

Verwendungsweck

MONALISA High Elastic ist für die Augmentation von Weichgewebe und die Behandlung von Gesichtsptosepathie bestimmt und enthält das Lidokainhydrochlorid Lidocain für eine weitere Anwendung.

1. Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

• Das Produkt ist nach Überprüfung der Verpackung auf Beschädigung oder Verunreinigung des Produkts und des Verkaufsvertrags zu verwenden. Verwenden Sie keine abgebliebenen, beschädigten Produkte.

• Der Patient sollte vor der Behandlung über den Zweck, die Voraussetzungen und die Risiken der Behandlung informiert und mögliche unerwünschte Ereignisse informiert werden.

• Eine ordnungsgemäßes Injektionskonzept ist für die Erzielung positiver Ergebnisse entscheidend. Die Injektion ist vom Hersteller angegebene Injektionstechnik vor der ersten Injektion sehr wichtig.

• Der Patient sollte nur von qualifiziertem medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden.

2. Behandlungsverfahren

• Eine sichere Behandlung setzt voraus, dass sterile Nadeln und Kanülen verwendet werden, die den Luer-Lock-Spezifikationen der Spritzenstift entsprechen.

• Um eine sichere Behandlung zu gewährleisten, muss die Nadel korrekt auf die Spritze gelegt werden, die die Nadel abdecken. Haken kann die Spritze leicht vom Kontakt mit der Nadel abheben. Haken die Verbindung zwischen der Spritze und dem Luer-Lock-Nadeln und den sterilen Nadeln abzuheben.

• Die Behandlungsmethode oder mit der Entfernung des Implantats behandeln. Bei schweren Symptomen Kontra eine Behandlungsmethode oder mit der Entfernung des Implantats.

• Vermeiden Sie, die Nadel zu verbiegen, wenn sie nicht bricht.

• Das Produkt darf nicht in die Dermis oder den unteren Teil der Dermis eindringen.

• Durch langsames Drücken des Stabes bis zum Austritt eines kleinen Wassersprays wird die Sicherheit und Wirkksamkeit einer Langzeitbehandlung mit Aufnahme eines durch Mischung hergestellten Gels gewährleistet.

• Bei Verwendung einer Nadel wird eine Aspiration vor der Anwendung empfohlen. Nach der Anwendung der Nadel kann die Nadel langsam nach hinten ziehen.

• Die Nadel ist erst nach Beendigung der Injektion vollständig herauszuziehen.

• Für jede Injektionsstelle müssen eine neue Nadel und Kanüle verwendet werden. Nach jeder Injektion sollte die Hygiene sorgfältig zu maximieren und die Anpassung der auf die umliegende Gewebe zu erledigen.

• Durch regelmäßige und gezielte Behandlungen können die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Die Behandlung kann je nach Erfassung des Anwenders und der Vorliebe des Patienten angepasst werden.

3. Lagerung der Anwendung

• Nach dem Abnehmen und gebraucht und abgelegte Produkte, einschließlich Nadeln und Kanülen, ordnungsgemäß zu entsorgen.

• Angewandte möglicher Kontaminations-, Verunreinigungs- und Infektionsrisiken dürfen die gebrauchte Produkte nicht wieder verwendet werden.

• Diese Produkte sind kein Einwegprodukt zum einmaligen Gebrauch, darf nicht wieder verwendet werden.

Vorschrittsmaßnahmen bei der Anwendung**1. Kontamination**

• Das Produkt ist ausschließlich für die intramalelle Injektion bestimmt.

• Das Produkt dieses Produkts in Blutgefäß ist verboten. Eine unbedachtige Einführung in die Blutgefäß kann zu Verschlüssen, Schädigung, usw. führen.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

2. Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Alter, Geschlecht und körperliche Verfassung

• Das Produkt nicht in einem Bereich, in dem ein Produkt direkt in die Haut eingebracht wird, in einem Bereich, der nicht abgeschottet ist. So besteht das Risiko einer Entzündung an der Injektionsstelle.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

3. Lagerung

• Bei Raumtemperatur lagern (-20°C)

• 2. Sonnenexposition schützen

• Das Produkt nicht belüftet lagern

Ablaufdatum

Siehe Unterseite der Verpackung

Gewicht / Packungseinheit

Siehe Unterseite der Verpackung

Lagerung

1. Bei Raumtemperatur lagern (-20°C)

2. Von Sonnenexposition schützen

3. Das Produkt nicht belüftet lagern

Verpackung

Siehe Unterseite der Verpackung

Wichtiges zur Verpackung

• Bei Raumtemperatur lagern (-20°C)

• 2. Sonnenexposition schützen

• Das Produkt nicht belüftet lagern

Informationen zur Absorption

• MONALISA High Basic Filler ist hydrogellose Injektion, wodurch er keinen Kontakt mit dem Körper hat.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

4. Andere Vorsichtsmaßnahmen

• Das Produkt ist ein Risiko einer Infektion. Durch eine aseptische Injektion und Standardeinheiten lassen sich Krebszellen verhindern.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

5. Lagerung und Behandlung

• Das Produkt darf nicht in einem Bereich, in dem ein Produkt direkt in die Haut eingebracht wird, in einem Bereich, der nicht abgeschottet ist. So besteht das Risiko einer Entzündung an der Injektionsstelle.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

6. Informationen zur Absorption

• Das Produkt ist ein Risiko einer Infektion. Durch eine aseptische Injektion und Standardeinheiten lassen sich Krebszellen verhindern.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

7. Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

• Das Produkt darf nicht in einem Bereich, in dem ein Produkt direkt in die Haut eingebracht wird, in einem Bereich, der nicht abgeschottet ist. So besteht das Risiko einer Entzündung an der Injektionsstelle.

• Bei Verwendung in einem Bereich, der zu schweren Nebenwirkungen wie Entzündungen kommt. Es wird daher empfohlen, die Spritze zu entfernen, wenn die Nadel, die Haut dort sehr dünn ist und es besteht ein hohes Risiko der Injektion in Blutgefäß. Dies ist der Behandlung besondere Vorsicht zu fordern.

• Die Injektion ist bei Wasserdurchlässiger Injektionsstelle sofort abzubrechen und die Behandlung sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Patienten mit Blutungsstörungen oder bei Patienten mit Thrombozytopenie oder Antikoagulantien eingenommen werden.

• Dieses Produkt darf nicht wieder verwendet werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

• Dieses Produkt darf nicht mit Urethan anwendet werden.

• Dieses Produkt ist nur für die Anwendung bei Patienten mit einer lokalen Anwendung, gegen Lidocain oder Anesthetika des Amphetams bestimmt.

8. Altersgruppe

• Das Produkt darf nicht bei Kindern eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.

• Das Produkt darf nicht bei Jugendlichen eingesetzt werden.